

小兒麻醉 安全須知

小孩子因為心理尚未成熟，手術中無法配合，需要上全身麻醉，小孩子容易對手術室的陌生環境，爸媽不在身邊產生恐懼，所以家長的配合和了解是非常重要的。

手術前禁食

一歲以下的嬰兒需禁食四小時，一歲以上則應禁食六小時，如果很餓，可以喝少量糖水（沒有顆粒，不含牛奶成份）。



手術前評估及麻醉風險：

小孩其心臟，呼吸，神經、其它系統未發育成熟，麻醉風險較成人為高，風險包括缺氧和心臟及其它各系統併發症等不可輕忽。

有以下情形家長事前告知：

1. 有感冒、咳嗽、流鼻涕、發燒等上呼吸道感染時，必要時將手術延期。
2. 有感冒的兒童施行麻醉，造成呼吸道併發症的機會是正常的四到七倍。年紀愈小，感冒接受麻醉其危險性愈高。
3. 有先天性心臟病，早產，或其他疾病如過敏，氣喘，癲癇，蠶豆症，肝病，腎臟病等，麻醉風險大幅增加。

麻醉過程

兩歲以前的小孩通常無法合作一般是採取快速面罩吸入式麻醉。已經上幼稚園可以溝通的小朋友，是用漸近式面罩吸入麻醉法，面罩內含有麻醉氣體；家長可以換上手術衣、戴帽子、口罩，進手術室陪伴麻醉誘導，降低小孩的恐懼不安。



手術或檢查結束後，送至恢復室照顧，家長可以進入恢復室陪伴小朋友，減輕其焦慮。

術後止痛

一般可用肌肉注射嗎啡類藥物或口服止痛藥，有時有噁心嘔吐的副作用。

您可以放心的把小孩交給專業的麻醉團隊做最妥善的照顧。



資料來源：照片由網路截取