

檢驗名稱	抗嗜中性球細胞質抗體	英文名稱	ANCA
檢驗代碼	anca	健保編號(點數)	12171B 380
檢體種類	Serum	檢驗方法	IFA
採集容器	含 Gel 紅頭試管	操作時間	每週三
採檢體量	3-5 ml	報告時間	10 個工作天
送檢時間	採檢後一小時內	操作單位	聯合醫事檢驗所
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存			
生物參考區間	ANCA : <10X,Negative p-ANCA : <10X,Negative c-ANCA : <10X,Negative Atypical pANCA : <10X,Negative		
臨床意義	ANCA測定全身性的血管炎，作為診斷及治療效果的評估。使用乙醇固定的中性球，表現在細胞質(cytoplasmic)的螢光稱為c-ANCA，測定serine protease 3協助診斷Wegener's granulomatosis(肉芽腫)；表現在細胞核周圍(perinuclear)的螢光稱為p-ANCA，測定myeloperoxidase協助診斷microscopic polyangitis(多血管炎)。對於85% 潰瘍性結腸炎(Ulcerative Colitis)及5-10% 的區域性腸炎(Crohn's Disease)，還可表現atypical p-ANCA螢光		
備註			