

檢驗名稱	部份凝血活酶時間	英文名稱	Activated partial thromboplastin time (APTT)
檢驗代碼	aptt	健保編號(點數)	08036B (180)
檢體種類	Whole Blood	檢驗方法	凝固法(Coagulate)
採集容器	含 3.2% sodium citrate 抗凝劑的 PT 管	操作時間	24 小時
採檢體量	需依採血管規格採血至標準線	報告時間	急件一小時，一般件 3 小時
送檢時間	採檢完一小時內送檢	操作單位	檢驗科
採檢注意 (病人準備)	避免溶血		
檢體保存	APTT: 在 $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 可保存 4 小時，若病人有 heparin 治療，則其血漿在 $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 只可保存 2 小時。		
生物參考區間	32.0~45.1 second。		
臨床意義	<p>APPT 主要應用於：</p> <p>(1)做為內在凝固路徑 (factors VIII、IX、XI、XII、Fletcher factor and Fitzgerald factor) 缺乏的篩檢。</p> <p>(2)可用做 fibrinogen 與 factors II、V and X 缺乏的檢測。</p> <p>(3)對於有出血傾向病人的篩檢。</p> <p>(4)用來監控與調整 heparin 的治療。</p> <p>(5)做為 Lupus Anticoagulants 的篩選。</p>		
備註			