

檢驗名稱	鉀	英文名稱	Potassium (K)
檢驗代碼	k	健保編號(點數)	09022C(40)
檢體種類	Serum/Plasma	檢驗方法	Indirect ISE
採集容器	含 Gel 紅頭管/Heparin 綠頭管	操作時間	每天
採檢體量	至少 3ml	報告時間	急診 40 分、門診急件 1 小時、一般件 8 小時
送檢時間	24 小時收件	操作單位	檢驗科
採檢注意	無		
檢體保存	(1) 建議採檢後2小時內進行離心 (2) 離心後室溫(15-30°C)不超過8小時 (3) 2-8°C 不超過48小時		
生物參考區間	血液：3.5-5.1 mmol/L 24 小時尿液：25-125 mmol/day	可報告範圍	血液：1.0-10.0 mmol/L 尿液：2.0-200 mmol/L
臨床意義	(1)鉀的測量是用來診斷和治療低血鉀症，高血鉀症，腎臟衰竭，愛迪生氏症 (Addison's Disease) 或與電解質不平衡相關的疾病。 (2)上升於大量溶血、嚴重的組織損傷（外傷或手術後）、挨餓、劇烈活動（如癲癇患者）、脫水等、腎功能不佳及呼吸性酸中毒等。 (3)下降於鉀攝取減少、持續性嘔吐、腹瀉、糖尿病、腎盂腎炎、腎小管酸中毒、類固醇治療、使用利尿劑、葡萄糖和胰島素的治療、家族性週期性麻痺、庫欣氏症候群等、鹼血症等。		
備註			